

# 10 ข้อควรระวัง เกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบ้า



1. โรคพิษสุนัขบ้า เมื่อเกิดอาการขึ้นแล้ว ไม่สามารถรักษาให้หายได้ ต้องเสียชีวิตทุกราย

2. โรคพิษสุนัขบ้า สามารถเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นได้ด้วย เช่น แมว ชะนี ลิง กระรอก กระแต หงู ค้างคาว หรือแม้กระทั่ง วัว ควาย ม้า สุนัข

3. สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่เสี่ยงที่สุด กว่า 95 % ของผู้เสียชีวิตมาจากสุนัข

4. สุนัขและแมว ที่ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าสามารถแพร่เชื้อได้ทางน้ำลาย

5. คาถา 5 ข. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

**อย่าแหยง อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าขยิบ อย่าขู่**

6. หากถูกสัตว์กัดหรือข่วนให้รีบล้างแผลให้เร็วที่สุดด้วยน้ำสะอาดและสบู่หลายๆ ครั้ง แล้วใส่ยาฆ่าเชื้อจากนั้นไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีเมื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

7. ควรรับวัคซีนตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเฝ้าระวังสุนัขหรือแมวที่มากัดเป็นเวลา 10 วัน หากสัตว์ตายระหว่างดูอาการ ให้แจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่เมื่อตัดหัวสุนัขส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

8. อาการสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบับาระยะเริ่มแรก เช่น สุนัขจะมีอารมณ์และอุปนิสัยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ม่านตาขยายกว้างกว่าปกติ กระจกตาขุ่นมัวหรือมีอาการเคี้ยวหรือกลืนผิดปกติ

9. ต้องนำสุนัขหรือแมว ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี

10. ไม่ปล่อยให้สุนัขไปเล่นพ่วงในที่สาธารณะตามลำพัง ต้องใส่สายจูงเมื่อพาสุนัขออกนอกบ้าน ถ้าสุนัขดูควรสวมเครื่องป้องกันสุนัขกัด

